

Грипп птиц

В целях недопущения заноса и распространения вируса гриппа необходимо придерживаться следующих правил:



Первые симптомы

Отказ от корма и воды.
Взъерошенность оперения.
Изменение цвета гребня и конечностей.
Нарушение координации движения.
Тремор.
Неестественная поза.

Необходимо

Содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих её контакт с посторонней птицей (безвыгульное содержание)

Осуществлять

Завоз новой птицы только из благополучных по гриппу областей и районов, при наличии ветеринарных сопроводительных документов
Поступившую птицу в течении не менее 10 дней содержать изолированно, наблюдать за ее состоянием

Профилактика

Владельцам предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию птиц для осмотра и вакцинации.
Использовать для кормления корма прошедшие термическую обработку.
Обеспечить защиту помещений от проникновения диких, в том числе синантропных птиц и грызунов.
Обеспечить обеззараживание подстилки путем сжигания или биотермическим методом.
Изолировать хранение кормов и инвентаря по уходу в закрытом помещении.

При первых признаках заболевания и в случае массового падежа птицы необходимо немедленно обратиться в учреждение государственной ветеринарной службы.

Тел: 8(4212)91-84-67; тел: 8-914-209-41-15